

化学療法指示書

セツキシマブ・ビメチニブ・エンコラフェニブ(3剤併用)療法 1週1クール

投与日: _____

患者ID:	前回投与日:
患者氏名	指示者
身長: cm 体重: kg	体表面積 m ²

月 日	メインルート		ルートキープ
① [:]	生食 100ml デキサメタゾン 3.8mg クロルフェニラミン マレイン酸塩 5mg	1V 2A 1A	生食 250ml 1V (単剤で使用)
② [:]	生食 600ml セツキシマブ 400mg/r (全量600mlとなるよう調整)	1V 4V	
	400mg/m ² → () mg		
② [:]	生食 250ml セツキシマブ 250mg/m ² (全量250mlとなるよう調整)	1V 2.5V	
	250mg/m ² → () mg		

ルートキープ+① → day1~2

ビメチニブ錠	90mg/日	分2 朝夕食後	day1~7
エンコラフェニブカプセル	300mg/日	分1 朝食後	day1~7

ビメチニブを減量する場合

通常投与量	45mg	1日2回
1段階減量	30mg	1日2回
2段階減量	15mg	1日2回
3段階減量	投与中止	

エンコラフェニブを減量する場合

通常投与量	300mg	1日1回
1段階減量	225mg	1日1回
2段階減量	150mg	1日1回
3段階減量	投与中止	

* アービタックスはInfusion reactionが、投与中または投与開始24時間以内にあらわれることがあるので、注意が必要。

処方監査印	調剤印	監査印