

# 化学療法指示書

## wPTX+RAM療法

(使用薬剤:パクリタキセル)

1サイクル28日

1、3週目

年 月 日

ID:			
氏名		指示者	前回投与日
身長:	体重:	体表面積	クール目
	Kg	m <sup>2</sup>	

		メインルート	
① [ : ]	生食 100ml 1V	①	点滴静注 15分
15分かけて	オルガドロン注 3.8mg 4A		
点滴静注	ガスター注 20mg 1V		
	ホラミン注 5mg 1A		
② [ : ]	サイラムザ注 400mg V	②	点滴静注 60分
60分かけて	生食 250ml 1V		
点滴静注	8 0		
	mg/Kg		
③ [ : ]	生食 100ml 1V	③	サイラムザの過敏発現の有無を確認
60分かけて			
点滴静注			
④ [ : ]	生食 250ml 1V	④	点滴静注 60分
60分かけて	パクリタキセル 100mg V		
点滴静注	パクリタキセル 30mg V		
	80 0		
	mg/m <sup>2</sup> mg		
⑤ ルートをウォッシュアウト	生食 100ml 1V	⑤	点滴後 抜針

①初回、2回目60分  
3回目以降は30分に短縮可

**【パクリタキセル投与時の注意】**  
 ①ルートは「ファイナルフィルターPS(PVCフリー)」を使用  
 ②投与開始10分間はアナフィラキシー様症状が出やすいので十分に観察を行う

調剤印	監査印